

PROTESIS FIJA

Al principio

- Puede existir la impresión que los dientes nuevos- coronas- son grandes y presionan los dientes adyacentes aunque desaparece rápidamente.
- La fonación de algunas letras puede alterarse o generar dificultades, sobre todo si las coronas son de dientes anteriores, esto se normaliza después de unos días cuando la lengua se acomode a la nueva prótesis.
- Es probable morderse fácilmente las mejillas y la lengua, esto se debe a la tendencia de llenar espacios donde faltaban los dientes. Esto desaparecerá mientras se adapta a las nuevas prótesis.

Si se decide cementar la prótesis de manera temporal tenga en cuenta lo siguiente:

- Se puede despegar, en este caso, lávela y vuélvala a insertar en su sitio y acuda de manera inmediata al consultorio.
- Puede sentir molestias al masticar, con alimentos fríos, calientes o dulces. Por favor avisar estar atento a esto para informarnos.
- Aproveche ese tiempo de cementación temporal para asegurarse que la forma, color y tamaño de los dientes sea de su agrado.
- Si observa empaquetamiento de comida o retención de alimentos en las prótesis, coméntenos antes de cementarla de manera definitiva.

Cuidados e Higiene

- Evite partir alimentos duros con las prótesis, al igual que tampoco deben morderse con los dientes naturales.

- Debe realizar el cepillado después de cada comida, y en especial antes de dormir, donde se recomienda el uso indiscutible de la seda dental, si su prótesis es de dientes ferulizados, el uso de enhebradores y cepillos interproximales está indicado.

Revisiones e incidencias

- Cuando las prótesis estén cementadas de manera definitiva, es importante realizar un mantenimiento cada 6 meses, donde se evaluará presencia de caries, inflamación de las encías y sangrado y movilidad entre otros.
- Si encuentra alguna anomalía, molestias o movilidad, no espere a su cita de mantenimiento, pida una cita lo antes posible.

DRA. LAURA LARA